

CALCIDEL EDTA

Concentré de Calcium complexé.

Calcidel EDTA est une solution concentrée de Chlorure de Calcium d'une qualité exceptionnelle, chélatée par des acides carboxyliques pour stimuler et améliorer la mobilité du Calcium dans la plante.

Calcidel EDTA a été conçue pour apporter une forme de Calcium 100% assimilable et disponible pour la plante et le fruit. Cette solution offre une meilleure résistance aux chocs des fruits, permet de prévenir le Bitter-pit sur Pommes, limite les maladies de conservation des fruits et contribue à en augmenter la durée (shelf-life).

Calcidel EDTA est recommandée également sur les espèces sensibles à l'éclatement (Cerises, Pêches, Nectarines, Agrumes, etc.). Calcidel EDTA®, c'est protéger les fruits contre les tâches préjudiciables à leur valeur de commercialisation. Nous recommandons son utilisation en apport foliaire, pour un rendement meilleur et des fruits de qualité.

Calcidel EDTA peut aussi être préconisé pour les cultures en sols salins: une excellente source de Calcium non agressive pour un usage foliaire ou racinaire.

Quantités Garanties	%p/p
Oxyde de Calcium (CaO)	10.5
Bore (B)	0.2
Dioxyde de silicium (SiO_2)	1000ppm

pH = 4.0 ± 0.5 d = 1.22

5L
DISPONIBLE

INSTRUCTIONS D'EMPLOI
Dilution conseillée: 400 à 600 ml dans 100 L d'eau.

Contrôle par ECOCERT INTRANTS

**Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (UE) 2018/848 et 2021/1165.
Contrôle ECOCERT F-32600.**

DOSES

CULTURES	APPLICATION FOLIAIRE
Maraîchage et contre la nécrose apicale et marginale, ou de la pourriture du fruit	3-5 L/ha 2 à 3 applications : à partir de la nouaison, au grossissement des fruits et jusqu'à la récolte.
Cultures industrielles	3-5 L/ha. Selon le besoin tous les 7-14 jours à partir de la floraison.
Légumes à feuilles et contre la nécrose margi- nale « Tip burn»	2-4 L/ha. Selon le besoin à partir de la formation de la tête.
Arbres fruitiers et contre le Bitter-Pit	4-6 L/ha. · Traitements précoces: 20 jours après nouaison / 40 jours après nouaison. · Traitements tardifs: 60 jours avant récolte / 40 jours avant récolte / 20 jours avant récolte. · Une application supplémentaire est recommandée après un épisode de pluie.
Vigne et kiwi	3-5 L/ha. Selon le besoin tous les 7-14 jours à partir de la nouaison.