Rainbow bio
all about growing

# JARDO

## CORRECTEUR DE CARENCE

**Information sur le produit:**

**JARDO - Correcteur de Carence en Fer**

**JARDO** est un chélate EDDHA de fer 6% (4.8% ortho-ortho) hautement stable et biodisponible, efficace même en sols alcalins. Sa formule concentrée assurant une nutrition continue du système racinaire, des feuilles et des parties reproductrices de la plante.

**JARDO** Prévient et corrige les carences en fer avec une action rapide et prolongée, ainsi qu'il stimule l'activité photosynthétique et convient à toutes cultures.

**معلومات عن المنتج**

**JARDO** هو مركب مخلب للحديد متخصص يحتوي على 6٪ من الحديد (Fe)، مخلب بواسطة **EDDHA (4.8% orto-orto)** وقابل للذوبان الكامل في الماء. تم تصميمه للوقاية من نقص الحديد وتصحيحه بدءًا من نظام الجذور وصولاً إلى الأوراق والهياكل التناسلية للنباتات.

تضمن تركيبته عالية التركيز والمستقرة في التربة ثباتًا ممتازًا وتوافرًا حيويًا كبيرًا، حتى في التربة القاعدية حيث تُثبط مصادر الحديد الأخرى بسهولة.

يوفر **JARDO** إمدادًا سريعًا وطويل الأمد بالحديد، مما يضمن تغذية مستمرة، ويقي بفعالية من نقص الحديد، ويدعم النشاط الضوئي للنباتات.

مع **JARDO**، يتم ضمان الوقاية وتصحيح نقص الحديد في جميع المحاصيل.

| COMPOSITION GATANTIE | w/w |
|---|---|
| Fer (Fe): Chélaté en EDDHA (4.8% ortho-ortho) | 6% |

**5 KG**
**كغ**

## Risques et Contre-indications

Toxicité en cas de surdosage : Peut endommager les cultures. Irritation : Risque d'irritation en cas de contact avec la peau ou les yeux.Ne pas mélanger avec des produits alcalins. Eviter sur sols fortement acides.

## Précautions d'emploi

Lisez l'étiquette avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants, des animaux et des aliments.
Ne jamais dépasser les doses recommandées et n'utilisez le produit que lorsque cela est nécessaire.
Utiliser des masques, des gants et des lunettes de protection lors de la fertilisation.
Évitez le contact avec les yeux, le visage et la peau ; en cas de contact, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.
Ne pas avaler le produit, consulter un médecin en cas d'ingestion.
Lavez vos mains abondamment après utilisation.
Ne réutilisez pas les emballages vides pour d'autres fins, jetez-les.
Il est recommandé de réaliser une analyse du sol et/ou des feuilles avant l'application du fertilisant.

## Considérations lors de l'utilisation et du stockage

Il est recommandé de réaliser des essais de prémélange avant de préparer une grande quantité de mélange pour l'application.

## Conditions de stockage

Le produit conserve ses propriétés physiques et chimiques pendant au moins 2 ans lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri de la lumière directe, dans un environnement frais et sec, entre 0 °C et 30 °C. Par conséquent, conservez le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et frais, à la température spécifiée. Ne jamais exposer le produit à la lumière directe du soleil.

## Usages et doses applications:

| Groupe de cultures | Nombre d'applications | Dose d'applications |
|---|---|---|
| Agrumes | Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant la croissance végétative ou dès l'apparition des symptômes de carence en fer | Application au sol (jeunes arbres) : 5-15 g/plante Application au sol (début de production) : 30-50 g/plante Application au sol (en pleine production) : 60-100 g/plante |
| Légumes (Tomate, aubergine, poivron, concombre...) | Appliquer 1 à 4 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant la croissance végétative ou dès l'apparition des symptômes de carence en fer. | Application au sol : 1-3 g/plante ou 3-5 g/$m^2$ |
| Arbres fruitiers (Pomme, poire, abricot, cerise, amande, ...) | Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant la croissance végétative ou dès l'apparition des symptômes de carence en fer. | Application au sol (jeunes arbres) : 5-15 g/plante Application au sol (début de production) : 30-50 g/plant Application au sol (en pleine production) : 60-100 g/plante |
| Fruites rouges (Fraise, myrtille, framboise...) | Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant la croissance végétative ou dès l'apparition des symptômes de carence en fer. | Application au sol : 1-3 g/plante ou 3-5 g/$m^2$ |
| Olivier | Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant la croissance végétative ou dès l'apparition des symptômes de carence en fer. | Application au sol (jeunes arbres) : 5-15 g/plante Application au sol (début de production) : 30-50 g/plante Application au sol (en pleine production) : 60-100 g/plante |
| Vignes | Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant la croissance végétative ou dès l'apparition des symptômes de carence en fer. | Application au sol (jeunes arbres) : 3-5 g/plante Application au sol (en pleine production) : 5-10 g/plante |

## المخاطر وموانع الاستعمال

التسمم في حالة الجرعة الزائدة: قد يتسبب في تلف المحاصيل التهيج: خطر التهيج في حال ملامسة الجلد أو العينين. عدم الخلط مع المنتجات القاعدية.
تجنب الاستخدام على التربة الحمضية .

## احتياطات الاستعمال

اقرأ الملصق جيدًا قبل الاستعمال.
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والأغذية.
لا تتجاوز الجرعات الموصى بها، واستعمل المنتج فقط عند الضرورة.
يُستحسن ارتداء الكمامة والقفازات والنظارات الواقية أثناء التسميد.
تجنب ملامسة العيون أو الوجه أو الجلد، وفي حالة الملامسة اغسل فورًا بكمية وافرة من الماء.
لا تبتلع المنتج، واستشر الطبيب في حالة الابتلاع.
اغسل يديك جيدًا بكمية كافية من الماء بعد الاستعمال.
لا تُستخدم العبوات الفارغة لأي غرض آخر، وتُتلف بطريقة آمنة.
يُنصح باستخدام السماد بعد إجراء تحليل للتربة و/أو الأوراق.

## الاعتبارات الواجب مراعاتها أثناء الاستعمال والتخزين

يُوصى بإجراء تجارب خلط أولية بكميات صغيرة قبل تحضير كميات كبيرة من الخليط المخصص للتطبيق.

## شروط التخزين

يحتفظ المنتج بخصائصه الفيزيائية والكيميائية لمدة لا تقل عن سنتين عند تخزينه في عبوته الأصلية المغلقة، وفي مكان بارد وجاف بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، وفي درجة حرارة تتراوح بين 30 و0 درجة مئوية. ولهذا يُوصى بتخزين المنتج في عبوته الأصلية، في مكان جاف وبارد، ضمن درجات الحرارة المحددة أعلاه. يُمنع منعًا باتًا تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة بأي شكل من الأشكال.

## المحاصيل، توقيت وجرعة الاستعمال

| مجموعة المحاصيل | الجرعة الموصى بها | عدد مرات التطبيق |
|---|---|---|
| الحمضيات | تطبيق على التربة (الأشجار الصغيرة): 5-15 غ/ شجرة تطبيق على التربة (بداية الإنتاج): 30-50 غ/ شجرة تطبيق على التربة (الإنتاج الكامل): 60-100 غ/ شجرة | 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو أو عند ظهور أعراض نقص الحديد. |
| الخضروات (الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الخيار...) | تطبيق على التربة: 1-3 غ/نبات أو 3-5 غ/م² | يُطبق 1 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري أو عند ظهور أعراض نقص الحديد. |
| الأشجار المثمرة (التفاح، الكمثرى، المشمش، الكرز، اللوز...) | تطبيق على التربة (الأشجار الصغيرة): 5-15 غ/نبات تطبيق على التربة (بداية الإنتاج): 30-50 غ/نبات تطبيق على التربة (الإنتاج الكامل): 60-100 غ/نبات | يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري أو عند ظهور أعراض نقص الحديد. |
| الفواكه الحمراء (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر...) | تطبيق على التربة: 1-3 غ/نبات أو 3-5 غ/م² | يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري أو عند ظهور أعراض نقص الحديد. |
| الزيتون | تطبيق على التربة (الأشجار الصغيرة): 5-15 غ/نبات تطبيق على التربة (بداية الإنتاج): 30-50 غ/نبات تطبيق على التربة (الإنتاج الكامل): 06-100 غ/نبات | يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري أو عند ظهور أعراض نقص الحديد. |
| الكروم / العنب | تطبيق على التربة (الأشجار الصغيرة): 3-5 غ/نبات تطبيق على التربة (الإنتاج الكامل): 5-10 غ/نبات | يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري أو عند ظهور أعراض نقص الحديد. |

**Fournisseur:**
Shandong WEIFANG RAINBOW CHEMICALS CO.,LTD

**Importateur:**
RAINBOW AGROSCIENCES
RESIDENCE LES ORCHIDES 3 IMM.
A 1° ETAGE N° 2 MOHAMMEDIA, MAROC.

**Distributeur exclusif au Maroc :**
**GDIRAGRI**
Route de Tiznit - 19 lot. Yasmina
1 86150 Aït Melloul - Maroc



**Production date:**

**Lot No.:**

**Date d'expiration: 3 ans après la fabrication**