Contient des microorganismes. **Peut provoquer des réactions de sensibilisation.**
L'utilisation d'un **équipement de protection respiratoire** (appareil respiratoire jetable ou demi-masque filtrant, au minimum **EN 149 FFP3 ou équivalent**) est recommandée lors de la manipulation ou de l'application du produit.

PRÉCAUTIONS
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.

AVERTISSEMENT
Recommandations et responsabilités :
Les informations fournies résultent d'essais rigoureux, mais des facteurs externes (variétés, application, météo, stade phénologique) peuvent influencer les résultats → un test préalable sur la culture est recommandé.
L'entreprise garantit uniquement la composition et les teneurs du produit. L'utilisateur assume la responsabilité de tout dommage (manque d'efficacité, phytotoxicité, résidus) lié au non-respect des instructions de l'étiquette.
Les emballages vides doivent être éliminés selon la législation nationale.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
P401 Conserver séparément des produits alimentaires et des aliments pour animaux.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais.
Éviter l'exposition directe au soleil et maintenir une température comprise entre **5 et 35 °C.**
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Ne pas mélanger avec des **matières oxydantes** ou des **acides forts.**
Ne pas réutiliser les récipients pour d'autres produits.

PROPRIÉTÉS
RADISEI est une formulation exclusive et équilibrée à base **d'acides aminés d'origine végétale et de Bacillus subtilis (souche SEIBS23 appartenant à SEIPASA)**, qui exerce des fonctions spécifiques dans l'environnement racinaire : **fixation de l'azote, production de sidérophores et solubilisation du potassium dans le sol.**
Il a été démontré que **RADISEI** augmente la **qualité des fruits des cultures ligneuses,** augmente **la production et la qualité des cultures horticoles.** Il peut être utilisé avec les systèmes **d'irrigation goutte-à-goutte, aspersion et pulvérisation**, ainsi qu'en mélange avec des substrats.
Une **bonne homogénéisation du mélange est essentielle.**

يحتوي على كائنات دقيقة. **قد يسبب تفاعلات تحسسية.**
يوصى باستخدام **معدات حماية الجهاز التنفسي** (جهاز تنفس للاستعمال مرة واحدة أو قناع وجه مزود بفلتر، على الأقل وفق معيار **EN 149 FFP3 أو ما يعادله** (عند مناولة المنتج أو استعماله.

احتياطات الاستعمال
P102 يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
P270 يُمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استعمال المنتج.

تحذير
التوصيات والمسؤوليات:
المعلومات المقدمة هي نتيجة اختبارات دقيقة، لكن عوامل خارجية (الأصناف، طريقة التطبيق، الظروف المناخية، المرحلة الفينولوجية) قد تؤثر على النتائج ← يُنصح دائمًا بإجراء اختبار مسبق على المحصول.
تضمن الشركة فقط تركيبة المنتج ونسب مكوناته. يتحمل المستخدم مسؤولية أي ضرر (نقص الفعالية، السمية النباتية، المخلفات) ناتج عن عدم احترام تعليمات الملصق كليًا أو جزئيًا.
يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها.

تعليمات التخزين
P401 يُحفظ بعيدًا عن المواد الغذائية و منتجات تغذية الحيوانات.
P403+P235 يُخزن في مكان جيد التهوية. يُحفظ في مكان بارد.
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، و حافظ على درجة حرارة تتراوح بين **5 و35 درجة مئوية.**
لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.
لا تخلط المنتج مع **المواد المؤكسدة** أو **الأحماض القوية.**
لا تعد استعمال العبوات لمنتجات أخرى.

الخصائص
راديسي هو تركيبة حصرية ومتوازنة تعتمد على **الأحماض الأمينية ذات الأصل النباتي وبكتيريا Bacillus subtilis (السلالة SEIBS23 التابعة لشركة (SEIPASA)**، والتي تؤدي وظائف محددة في بيئة الجذور، تتمثل في **تثبيت الآزوت، وإنتاج السيديروفورات، وإذابة البوتاسيوم في التربة.**
وقد ثبت أن **راديسي** يساهم في **زيادة جودة ثمار المحاصيل الخشبية، يساهم في زيادة إنتاج وجودة المحاصيل البستانية** يمكن استعماله مع **أنظمة الري بالتنقيط، و الرش، و الرشاشات**، وكذلك ضمن خلطات الوسائط الزراعية.
يُعد **التجانس الجيد للخليط أمرًا أساسيًا.**

Fabricant :

SEIPASA, S.A.
22240 Tardienta (Huesca) Spain
Tel. +34 962 541 163
www.seipasa.com

Importe et distribue exclusivement par :
GDIRAGRI
N° 713, Av. Brahim Roudani
Zone Industrielle, Ait Melloul
Tél. : +212 528 240 564
Fax : +212 528 308 578
www.gdiragri.ma

Radisei

FERTILISANT AVEC MICROORGANISMES NON-MYCORHIZIENS

«Fertilisant soluble dans l'eau » à appliquer en fertigation

سماد يحتوي على كائنات دقيقة غير ميكوريزية
سماد قابل للذوبان في الماء» للاستعمال في التسميد عبر الري

Produit à base d'acides aminés libres obtenus par hydrolyse enzymatique de protéines végétales de soja.

منتج قائم على الأحماض الأمينية الحرة الناتجة عن التحلل الإنزيمي للبروتينات النباتية للصويا.

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE L'ÉTIQUETTE

قبل استعمال هذا المنتج، اقرأ تعليمات الملصق بعناية



Lot : .....

Poids net : الوزن الصافي: 1KG

CULTURES / المحاصيل	DOSE VIA SOL الجرعة عن طريق التربة	RECOMMANDATIONS D'UTILISATION / توصيات الاستعمال
Arboriculture fruitière – Agrumes – Vigne – Petit fruits rouges – Mangue – Avocat – Bananier – Ananas – Papaye – Kiwi زراعة الأشجار المثمرة - الحمضيات - الزيتون - العنب - الفواكه الحمراء - المانجو - الأفوكادو - الموز - الأناناس - البابايا - الكيوي.	2,5 à 5 kg/ha	Appliquer 2 à 4 fois toutes les 2 à 3 semaines, à partir du début du cycle (*) (**) et pendant les périodes de forte demande énergétique de la culture : débourrement, nouaison et grossissement des fruits. يُستعمل من 2 إلى 4 مرات كل 2 إلى 3 أسابيع، ابتداءً من بداية الدورة (*) (**) وخلال فترات ارتفاع الطلب على الطاقة من طرف المحصول: تفتح البراعم، العقد وتضخم الثمار.
Toutes les cultures maraîchères cultivées sur sol (plein air et sous serre) جميع محاصيل الخضر المزروعة في التربة (في الحقول المفتوحة والبيوت المحمية)	2,5 kg/ha	Appliquer 2 à 4 fois toutes les 2 à 3 semaines, à partir du repiquage ou dès que les plants ont émergé. Appliquer durant le dernier tiers de la période d'irrigation afin de garantir que le produit soit localisé dans le bulbe humide et d'éviter le lessivage. يُستعمل من 2 إلى 4 مرات كل 2 إلى 3 أسابيع، ابتداءً من إعادة الشتل أو بمجرد ظهور النباتات. يُستعمل خلال الثلث الأخير من فترة الري لضمان تمركز المنتج في منطقة التربة الرطبة وتجنب الغسل.

(*) Il est recommandé d'appliquer plus de fois en utilisant des doses plus faibles. Cela assure la ré-inoculation du sol et des racines afin de prolonger la viabilité des microorganismes.

(**) En cas d'application en irrigation par submersion, augmenter la dose entre 30 et 50 % selon les besoins des cultures.

Ne pas mélanger avec des produits fongicides et/ou bactéricides, ni avec des dérivés du cuivre. Il est recommandé de pré-diluer le mélange dans une petite quantité d'eau avant de l'ajouter à la cuve de traitement, en assurant une bonne homogénéisation.

(*) يوصى بإجراء عدد أكبر من التطبيقات باستعمال جرعات أقل. ويساعد ذلك على إعادة تلقيح التربة والجذور لإطالة مدة حيوية الكائنات الدقيقة.

(**) في حالة الاستعمال بواسطة الري بالغمر ، تُزاد الجرعة بنسبة 30 إلى 50 % حسب احتياجات المحاصيل.

لا تخلط المنتج مع مبيدات الفطريات و/أو مبيدات البكتيريا، ولا مع مشتقات النحاس. يوصى بتخفيف الخليط مسبقًا في كمية صغيرة من الماء قبل إضافته إلى خزان المعالجة، مع ضمان التجانس الجيد للخليط.

TENEURS DÉCLARÉES	المحتوى المصرح
Acides aminés libres : 35 % W/W	35% الأحماض الأمينية الحرة
Azote total (N) : 8,40 % W/W	8.40% (N) الآزوت الكلي
Azote organique (N) : 6,30 % W/W	6.30% (N) الآزوت العضوي
Azote ammoniacal (N) : 1,80 % W/W	1.80% (N) الآزوت الأمونيومي
Bacillus subtilis SEIBS23: ≥ 10^7 CFU/g	SEIBS23: ≥ 10^7 CFU/g باسيلوس سوبتيليس