Rainbow bio
all about growing

RANUTBOR

CORRECTEUR DE CARENCE

Information sur le produit:
RANUTBOR est une formulation concentrée de bore éthanolamine conçue pour favoriser une division cellulaire efficace, la floraison et la formation des fruits. Le bore est un micronutriment essentiel impliqué dans la formation des parois cellulaires, la croissance du tube pollinique et le transport des glucides, influençant directement le succès reproductif et la qualité des rendements.
RANUTBOR permet de prévenir et de corriger efficacement les carences en bore, assurant une floraison uniforme, une meilleure pollinisation et une meilleure formation des fruits. En soutenant la mobilité des nutriments et l'intégrité des tissus, **RANUTBOR**contribue à une structure végétale plus forte, une productivité améliorée et des récoltes de meilleure qualité.

معلومات عن المنتج

RANUTBOR هو مستحضر مركز للبورون مصمم لتعزيز الانقسام الخلوي الفعال، والتزهير، وتكوين الثمار. يُعد البورون من العناصر الدقيقة الأساسية المشاركة في تكوين جدران الخلايا، وغو أنبوب اللقاح، ونقل الكربوهيدرات، مما يؤثر بشكل مباشر على نجاح التكاثر وجودة المحاصيل.
يساعد **RANUTBOR** على الوقاية من نقص البورون وتصحيحه بفعالية، مما يضمن تزهيرًا متجانسًا، وتلقيحًا أفضل، وتكوينًا محسنًا للثمار. ومن خلال دعم حركة العناصر الغذائية وسلامة الأنسجة، يساهم **RANUTBOR** في تقوية بنية النباتات، وتحسين الإنتاجية، والحصول على محاصيل ذات جودة أعلى.

COMPOSITION GARANTIE	w/w
B(Bore) soluble dans l'eau	11%

5L
لتر

Risques et Contre-indications

Inclure tous les risques ou contre-indications possibles, tels que les types de plantes incompatibles ou la compatibilité avec certains engrais/pesticides.

Précautions d'emploi

Lisez l'étiquette avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants, des animaux et des aliments.
Ne jamais dépasser les doses recommandées et n'utilisez le produit que lorsque cela est nécessaire.
Utiliser des masques, des gants et des lunettes de protection lors de la fertilisation.
Évitez le contact avec les yeux, le visage et la peau ; en cas de contact, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.
Ne pas avaler le produit, consulter un médecin en cas d'ingestion.
Lavez vos mains abondamment après utilisation.
Ne réutilisez pas les emballages vides pour d'autres fins, jetez-les.
Il est recommandé de réaliser une analyse du sol et/ou des feuilles avant l'application du fertilisant.

Considérations lors de l'utilisation et du stockage

Il est recommandé de réaliser des essais de prémélange avant de préparer une grande quantité de mélange pour l'application.

Conditions de stockage

Le produit conserve ses propriétés physiques et chimiques pendant au moins 2 ans lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri de la lumière directe, dans un environnement frais et sec, entre 0 °C et 30 °C. Par conséquent, conservez le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et frais, à la température spécifiée. Ne jamais exposer le produit à la lumière directe du soleil.

Usages et doses applications:

Crop group	Application timing	Application dose
Céréales (blés, mais, etc)	Appliquer 1à 3 fois pendant le cycle de culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, en particulier lorsque des carences en bore sont attendues ou visibles dans la culture	Application foliaire : 100-200 cc/hl
Légumes (Tomate, aubergine, poivron, concombre..)	Appliquer 2 à 5 fois pendant le cycle de culture, à partir de la pré-floraison et continuer pendant la formation et le développement des fruits	Application foliaire : 100-200 cc/hl
Arbres fruitiers (Pomme, poire, abricot, cerise, agrumes, amande, pistache..)	Appliquer 1 à 4 fois pendant le cycle de culture, à partir de la pré-floraison et continuer pendant la formation et le développement des fruits. Pour les cultures à feuilles caduques, commencer les applications lors de l'éclatement des bourgeons. Une application après la récolte est recommandée pour aider à la récupération des cultures	Application foliaire : 100-300 cc/hl
Fruits rouges (Fraise, myrtille, framboise..) (Strawberry,..)	Appliquer 2 à 5 fois pendant le cycle de culture, à partir de la pré-floraison et continuer pendant la formation et le développement des fruits	Application foliaire : 150-300 cc/hl
Olivier	Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture, à partir de la pré-floraison et continuer pendant la formation et le développement des fruits. Une dernière application du durcissement des noyaux est recommandée	Application foliaire : 200-300 cc/hl
Vigne	Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture, à partir de la pré-floraison et continuer pendant la formation et le développement des fruits. Une dernière application lors du durcissement des noyaux est recommandée	Application foliaire : 100-300 cc/hl
Tubercules & Bulbes (Pomme de terre, carotte, oignon..)	Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de culture, à partir de l'initiation des tubercules/bulbes et continuer pendant le remplissage des tubercules/bulbes	Application foliaire : 100-200 cc/hl

المخاطر وموانع الاستعمال

رجى ذكر أي مخاطر أو موانع محتملة، مثل أنواع النباتات غير المناسبة أو عدم التوافق مع أسمدة أو مبيدات معينة.

احتياطات الاستعمال

اقرأ الملصق جيدًا قبل الاستعمال.
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والأغذية.
لا تتجاوز الجرعات الموصى بها، واستعمل المنتج فقط عند الضرورة.
يُنصح بارتداء الكمامة والقفازات والنظارات الواقية أثناء التسميد.
تجنب ملامسة العيون أو الوجه أو الجلد، وفي حالة الملامسة اغسل فورًا بكمية وافرة من الماء.
لا تبتلع المنتج، واستشر الطبيب في حالة الابتلاع.
اغسل يديك جيدًا بكمية كافية من الماء بعد الاستعمال.
لا تُستخدم العبوات الفارغة لأي غرض آخر، وتُتلف بطريقة آمنة.
يُنصح باستخدام السماد بعد إجراء تحليل للتربة و/أو الأوراق.

الاعتبارات الواجب مراعاتها أثناء الاستعمال والتخزين

يُوصى بإجراء تجارب خلط أولية بكميات صغيرة قبل تحضير كميات كبيرة من الخليط المخصص للتطبيق.

شروط التخزين

يحتفظ المنتج بخصائصه الفيزيائية والكيميائية لمدة لا تقل عن سنتين عند تخزينه في عبوته الأصلية المغلقة، وفي مكان بارد وجاف بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، وفي درجة حرارة تتراوح بين 0 و30 درجة مئوية. ولهذا يُوصى بتخزين المنتج في عبوته الأصلية، في مكان جاف وبارد، ضمن درجات الحرارة المحددة أعلاه. يُمنع منعًا باتًا تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة بأي شكل من الأشكال.

المحاصيل، توقيت وجرعة الاستعمال

مجموعة المحاصيل	الجرعة الموصى بها	توقيت التطبيق
الحبوب (القمح، الذرة، إلخ)	الرش الورقي: 100-200 سم³/هكتولتر	يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح باليدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص البورون في المحصول.
الخضروات (الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الخيار...)	الرش الورقي: 100-200 سم³/هكتولتر	يُطبق 2 إلى 5 مرات خلال دورة نمو المحصول، بدءًا من مرحلة ما قبل التزهير، واستمر أثناء تكوين وتطوير الثمار.
الأشجار المثمرة (التفاح، الكمثرى، المشمش، الكرز، المحمضيات، اللوز، الفستق...)	الرش الورقي: 100-300 سم³/هكتولتر	يُطبق 1 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول، بدءًا من مرحلة ما قبل التزهير واستمر أثناء تكوين وتطوير الثمار. بالنسبة للمحاصيل ذات الأوراق المتساقطة، يُنصح باليدء بالتطبيقات عند انفجار البراعم. يُوصى بتطبيق بعد الحصاد للمساعدة في استعادة المحصول.
الفواكه الحمراء (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر...)	الرش الورقي: 150-300 سم³/هكتولتر	يُطبق 2 إلى 5 مرات خلال دورة نمو المحصول، بدءًا من مرحلة ما قبل التزهير واستمر أثناء تكوين وتطوير الثمار.
الزيتون	الرش الورقي: 200-300 سم³/هكتولتر	يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول، بدءًا من مرحلة ما قبل التزهير واستمر أثناء تكوين وتطوير الثمار. يُوصى بتطبيق أخير عند تصلب النوى.
الكروم / العنب	الرش الورقي: 100-300 سم³/هكتولتر	يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول، بدءًا من مرحلة ما قبل التزهير واستمر أثناء تكوين وتطوير الثمار. يُوصى بتطبيق أخير عند تصلب النوى.
الدرنات والبصل (البطاطس، الجزر، البصل...)	الرش الورقي: 100-200 سم³/هكتولتر	يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول، بدءًا من مرحلة بداية تكوين الدرنات/البصيلات واستمر أثناء امتلاء الدرنات/البصيلات.

Fournisseur:
Shandong WEIFANG RAINBOW CHEMICALS CO.,LTD

Importateur:
RAINBOW AGROSCIENCES
RESIDENCE LES ORCHIDES 3 IMM.
A 1° ETAGE N° 2 MOHAMMEDIA, MAROC.

Distributeur exclusif au Maroc :
GDIRAGRI
Route de Tiznit - 19 lot. Yasmina
1 86150 Ait Melloul - Maroc

GDIRAGRI

Production date: **Lot No.:** **Date d'expiration: 3 ans après la fabrication**