Rainbow bio
all about growing

RANUTRA Mg

CORRECTEUR DE CARENCE

Information sur le produit:

RANUTRA Mg est une formulation concentrée de magnésium conçue pour soutenir une activité photosynthétique optimale et un métabolisme équilibré des plantes. Le magnésium est l'atome central de la molécule de chlorophylle et joue un rôle essentiel dans le transfert d'énergie, l'activation des enzymes et la translocation des nutriments.

RANUTRA Mg a été spécifiquement développé pour prévenir et corriger les carences en magnésium, garantissant un feuillage d'un vert profond, une photosynthèse efficace et une meilleure utilisation de l'azote. En soutenant la synthèse de la chlorophylle et les fonctions enzymatiques clés, **RANUTRA Mg** favorise une croissance vigoureuse et équilibrée des plantes, améliorant ainsi la productivité globale et la qualité des récoltes.

معلومات عن المنتج

RANUTRA Mg هو مستحضر مركز للمغنيسيوم مصمم لدعم نشاط التمثيل الضوئي الأمثل واستقلاب متوازن للنباتات. يُعد المغنيسيوم الذرة المركزية في جزيء الكلوروفيل ويلعب دورًا أساسيًا في نقل الطاقة، وتنشيط الإنزيمات، وانتقال المغذيات.

تم تطوير **RANUTRA Mg** خصيصًا للوقاية من نقص المغنيسيوم وتصحيحه، مما يضمن أوراقًا خضراء داكنة، وفعالية عالية للتمثيل الضوئي، واستغلال أفضل للنيتروجين. ومن خلال دعم تخليق الكلوروفيل ووظائف الإنزيمات الرئيسية، يعزز **RANUTRA Mg** نموًا قويًا ومتوازنًا للنباتات، مما يحسن الإنتاجية العامة وجودة المحاصيل.

COMPOSITION GARANTIE	w/w
Magnésium (Mg): Soluble dans l'eau	8.5%

5L
لتر

Risques et Contre-indications

Inclure tous les risques ou contre-indications possibles, tels que les types de plantes incompatibles ou la compatibilité avec certains engrais/pesticides.

Précautions d'emploi

Lisez l'étiquette avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants, des animaux et des aliments.
Ne jamais dépasser les doses recommandées et n'utilisez le produit que lorsque cela est nécessaire.
Utiliser des masques, des gants et des lunettes de protection lors de la fertilisation.
Évitez le contact avec les yeux, le visage et la peau ; en cas de contact, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.
Ne pas avaler le produit, consulter un médecin en cas d'ingestion.
Lavez vos mains abondamment après utilisation.
Ne réutilisez pas les emballages vides pour d'autres fins, jetez-les.
Il est recommandé de réaliser une analyse du sol et/ou des feuilles avant l'application du fertilisant.

Considérations lors de l'utilisation et du stockage

Il est recommandé de réaliser des essais de prémélange avant de préparer une grande quantité de mélange pour l'application.

Conditions de stockage

Le produit conserve ses propriétés physiques et chimiques pendant au moins 2 ans lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri de la lumière directe, dans un environnement frais et sec, entre 0 °C et 30 °C. Par conséquent, conservez le produit dans son emballage

المخاطر وموانع الاستعمال

يُرجى ذكر أي مخاطر أو موانع محتملة، مثل أنواع النباتات غير المناسبة أو عدم التوافق مع أسمدة أو مبيدات معينة.

احتياطات الاستعمال

اقرأ الملصق جيدًا قبل الاستعمال.
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والأغذية.
لا تتجاوز الجرعات الموصى بها، واستعمل المنتج فقط عند الضرورة.
يُستحسن ارتداء الكمامة والقفازات والنظارات الواقية أثناء التسميد.
تجنب ملامسة العيون أو الوجه أو الجلد، وفي حالة الملامسة اغسل فورًا بكمية وافرة من الماء.
لا تبتلع المنتج، واستشر الطبيب في حالة الابتلاع.
اغسل يديك جيدًا بكمية كافية من الماء بعد الاستعمال.
لا تُستخدم العبوات الفارغة لأي غرض آخر، وتُتلف بطريقة آمنة.
يُنصح باستخدام السماد بعد إجراء تحليل للتربة و/أو الأوراق.

الاعتبارات الواجب مراعاتها أثناء الاستعمال والتخزين

يُوصى بإجراء تجارب خلط أولية بكميات صغيرة قبل تحضير كميات كبيرة من الخليط المخصص للتطبيق.

شروط التخزين

يحتفظ المنتج بخصائصه الفيزيائية والكيميائية لمدة لا تقل عن سنتين عند تخزينه في عبوته الأصلية المغلقة، وفي مكان بارد وجاف بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، وفي درجة حرارة تتراوح بين 0و30 درجة مئوية. ولهذا يُوصى بتخزين المنتج في عبوته الأصلية، في مكان جاف وبارد، ضمن درجات الحرارة المحددة أعلاه. يُمنع منعًا باتًا تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة بأي شكل من الأشكال.

Usages et doses applications:

Crop group	Application timing	Application dose
Céréales (Blés, Mais...)	Appliquer 1 à 3 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 100-300 cc/hl Fertigation : 3-5 L/ha
Légumes (tomate, aubergine, poivron, concombre..)	Appliquer 2 à 4 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 200-400 cc/hl Fertigation : 5-10 L/ha
Arbres fruitiers (pomme, poire, abricot, cerise, agrumes, amande, pistache..)	Appliquer 2 à 4 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 200-400 cc/hl Fertigation : 10-15 L/ha
Fruits rouge (fraise, myrtille, framboise..)	Appliquer 2 à 5 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 200-400 cc/hl Fertigation : 10-20 L/ha
Olivier	Appliquer 2 à 4 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 200-400 cc/hl Fertigation : 10-15 L/ha
Vigne	Appliquer 2 à 4 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 200-400 cc/hl Fertigation : 10-15 L/ha
Tubercules & Bulbes (pomme de terre, carotte, oignon..)	Appliquer 2 à 4 fois pendant le cycle de la culture. Commencer les applications pendant le développement végétatif, surtout lorsque des carences en magnésium sont attendues ou visibles.	Foliaire : 200-400 cc/hl Fertigation : 5-10 L/ha

المحاصيل، توقيت وجرعة الاستعمال

مجموعة المحاصيل	الجرعة الموصى بها	توقيت التطبيق
الحبوب (القمح، الذرة...)	الرش الورقي: 100-300 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 3-5 لتر/هكتار	يُطبق 1 إلى 3 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.
الخضروات (الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الخيار...)	الرش الورقي: 200-400 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 5-10 لتر/هكتار	يُطبق 2 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.
الأشجار المثمرة (التفاح، الكمثرى، المشمش، الكرز، الحمضيات، اللوز، الفستق...)	الرش الورقي: 200-400 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 10-15 لتر/هكتار	يُطبق 2 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.
الفواكه الحمراء (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر...)	الرش الورقي: 200-400 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 10-20 لتر/هكتار	يُطبق 2 إلى 5 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.
الزيتون	الرش الورقي: 200-400 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 10-15 لتر/هكتار	يُطبق 2 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.
الكروم / العنب	الرش الورقي: 200-400 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 10-15 لتر/هكتار	يُطبق 2 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.
الدرنات والبصل (البطاطس، الجزر، البصل...)	الرش الورقي: 200-400 سم³/هكتولتر الري بالتغذية: 5-10 لتر/هكتار	يُطبق 2 إلى 4 مرات خلال دورة نمو المحصول. يُنصح بالبدء بالتطبيقات خلال مرحلة النمو الخضري، خصوصًا عند توقع أو ظهور نقص في المغنيسيوم.

Fournisseur:
Shandong WEIFANG RAINBOW CHEMICALS CO.,LTD

Importateur:
RAINBOW AGROSCIENCES
RESIDENCE LES ORCHIDES 3 IMM.
A 1° ETAGE N° 2 MOHAMMEDIA, MAROC.

Distributeur exclusif au Maroc:
GDIRAGRI
Route de Tiznit - 19 lot. Yasmina
1 86150 Ait Melloul - Maroc

Production date: **Lot No.:** **Date d'expiration: 3 ans après la fabrication**